

レジメン名: Dara-Rd(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)・レナリドミド(レブラミド)
用法・用量	・デキサメタゾン:40mg/週(75歳以上は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	・レブラミド:1日1回25mg(3週連続内服しその後1週間休薬)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg
4	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ボラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	デキサート 6.6mg	3A											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15	10:15	10:15	10:15				
Rp.3	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。												
	・0.22μm以下のフィルター使用												
Rp.4	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00	11:00	11:00	11:00				
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時開始も条件付き可。												
	・0.22μm以下のフィルター使用。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A			1回	1回	1回	1回				
	ダラザレックス フラッシュ用												
Rp.6													

レジメン名: Dara-Rd(2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)・レナリドミド(レブラミド)
用法・用量	・デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週に減量可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	・レブラミド: 1日1回25mg (3週連続内服しその後1週間休薬)

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	デキサート 6.6mg	3A											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15	10:15	10:15	10:15				
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00	11:00	11:00	11:00				
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22μm以下のフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A			1回	1回	1回	1回				
	ダラザレックス フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: Dara-Rd(3-6サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)・レナリドミド(レブラミド)
用法・用量	・デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	・レブラミド: 1日1回25mg (3週連続内服しその後1週間休薬)

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00						
	デキサート 6.6mg	3A											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15	10:15						
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00	11:00						
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22 μm以下のフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A			1回	1回						
	ダラザレックス フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: Dara-Rd(7サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ダラザレックス(ダラツムマブ)	16	16	mg/Kg

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)・レナリドミド(レブラミド)
用法・用量	・デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週に減量も可)、点滴と内服で併せて施行されるためよく確認すること。
投与スケジュール	・レブラミド: 1日1回25mg (3週連続内服しその後1週間休薬)

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポラミン 5mg	1A	末梢A	持続点滴	15分	10:00							
	デキサート 6.6mg	3A											
	生理食塩液 50mL	1本											
	ダラザレックスの投与1時間前までに投与												
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	11:00							
	ダラザレックス												
	・50mL/時で開始し、1時間毎に50mL/時ずつ速度を上げられ、上限200mL/時で投与可能。100mL/時からの開始も条件付きで可能。 ・0.22 μm以下のフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A			1回							
	ダラザレックス フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													