

レジメン名: Elo-RD(1,2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド)・レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レブラミド:25mg/回、1日1回 (3週間内服後1週間休薬)
投与スケジュール	レナデックス:28mg/回、1日1回 (Day1,8,15,22に、エムプリシティ投与3-24時間前に内服)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	エムプリシティ(エロツズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	ボラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15	10:15	10:15	10:15				
Rp.3	エムプリシティ	1本	末梢A	持続点滴	0.5 mL/min	11:00	11:00	11:00	11:00				
	生理食塩液 250mL												
	・0.5mL/minで開始(最初30分)→1mL/min(30-60分)→2mL/min(60分以降)で速度UP可。 ・0.22μm以下のインラインフィルター使用												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本		処置用		1回	1回	1回	1回				
	エムプリシティ終了後のフラッシュ用												
Rp.5	注射用蒸留水 20mL	2A		処置用		1回	1回	1回	1回				
	エムプリシティ溶解用												
Rp.6													

レジメン名: Elo-RD(3サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レブラミド(レナリドミド)・レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	レブラミド:25mg/回、1日1回 (3週間内服後1週間休薬) レナデックス:【Day1,15】28mg/回 1日1回、【Day8,22】40mg/回 1日1回
投与スケジュール	(エムプリシティ投与3-24時間前に内服)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	エムプリシティ(エロツズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	15分	10:00	10:00						
	ポラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	45分	10:15	10:15						
Rp.3	エムプリシティ	1本	末梢A	持続点滴	5 mL/min	11:00	11:00						
	生理食塩液 250mL												
	・最大5mL/minで投与可能。 ・0.22μm以下のインラインフィルター使用。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本		処置用		1回	1回						
	エムプリシティ終了後のフラッシュ用												
Rp.5	注射用蒸留水 20mL	2A		処置用		1回	1回						
	エムプリシティ溶解用												
Rp.6													