# レジメン名：　KRd（1サイクル目）

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 28日 |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | レナデックス(デキサメタゾン) ・ レナリドミド(レブラミド) |
| 用法・用量 | レナデックス：40mg/週（1日1回20mgをDay1.2.8.9.15.16.22.23に内服）<br>レブラミド：1日1回25mg（3週連続内服しその後1週間休薬） |
| 投与スケジュール | |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | カイプロリス(カルフィルゾミブ) | 20mg/$m^2$ | 44mg | |
| 4 | カイプロリス(カルフィルゾミブ) | 27mg/$m^2$ | 59.4mg | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度（単位） | Day 1 | Day 2 | Day 8 | Day 9 | Day 15 | Day 16 | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 250mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 1 時間 | 10:00<br>11:15 | 10:00<br>11:15 | 10:00<br>11:15 | 10:00<br>11:15 | 10:00<br>11:15 | 10:00<br>11:15 | | |
| Rp.2 | カイプロリス<br>5% ブドウ糖液 100mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 15 分 | 11:00 | 11:00 | | | | | | |
| Rp.3 | 注射用蒸留水 20mL<br>カイプロリス溶解用 | 2A | | | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | |
| Rp.4 | カイプロリス<br>5% ブドウ糖液 100mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 15 分 | | | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン名：　KRd（2-12サイクル目）

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 28日 |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | レナデックス(デキサメタゾン) ・ レブラミド |
| 用法・用量 | レナデックス：40mg/週（1日1回20mgをDay1.2.8.9.15.16.22.23に内服）<br>レブラミド：1日1回25mg（3週連続内服しその後1週間休薬） |
| 投与スケジュール | |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | カイプロリス(カルフィルゾミブ) | 27mg/$m^2$ | 59.4mg | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度（単位） | Day 1 | Day 2 | Day 8 | Day 9 | Day 15 | Day 16 | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5 分 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | | |
| Rp.2 | カイプロリス<br>5% ブドウ糖液 100mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 15 分 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | | |
| Rp.3 | 注射用蒸留水 20mL<br>カイプロリス溶解用 | 2A | | | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | |
| Rp.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン名：　KRd（13サイクル目以降）

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 28日 |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | レナデックス(デキサメタゾン) ・ レナリドミド(レブラミド) |
| 用法・用量 | レナデックス：40mg/週（1日1回20mgをDay1.2.8.9.15.16.22.23に内服）<br>レブラミド：1日1回25mg（3週連続内服しその後1週間休薬） |
| 投与スケジュール | |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | カイプロリス(カルフィルゾミブ) | 27mg/$m^2$ | 59.4mg | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度（単位） | Day 1 | Day 2 | Day 15 | Day 16 | Day | Day | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5 分 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | 10:00<br>10:20 | | | | |
| Rp.2 | カイプロリス<br>5% ブドウ糖液 100mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 15 分 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | | | | |
| Rp.3 | 注射用蒸留水 20mL<br>カイプロリス溶解用 | 2A | | | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| Rp.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |