

レジメン名: Rituximab維持(BS)

【1コースの期間】

| | |
|----------|----|
| インターバル日数 | 7日 |
|----------|----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|----------|-----|-----|-------------------|
| 3 | リツキシマブBS | 375 | 375 | mg/m ² |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day 8 | Day 15 | Day 22 | Day | Day | Day | Day |
|------|--|-------|------|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | ソルコーテフ 100mg/V | 1V | 末梢A | フンショット静注 | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | ポララミン 5mg | 1A | 末梢A | フンショット静注 | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | リツキシマブBS | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| | 生理食塩液 500mL | | | | | | | | | | | | |
| | 初回投与時、最初の1時間は25mL/hの速度で開始、問題なければ100mL/hに上げて1時間投与し、問題なければ200mL/hまで速度UP可能。 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 処置用 | | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |