レンアン名: クトアレ/Mrulruxo 人物かん	レジメン名:	外アレ)mFOLFOX6 大腸がん	
---------------------------	--------	-------------------	--

【1コースの期間】 14日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	レボホリナート	200	200	mg/ m ²
3	オキサリプラチン	85	85	mg∕ m ੰ
4	フルオロウラシル	400	400	mg/ m ²
6	フルオロウラシル	2400	2400	mg∕ m ੰ

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1													
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	ガスター 20mg	1A	CV-A	┃ ┃ 持続点滴	30 分	10:00							
	ポララミン 5mg	1A] 0 7	可似然何	00 /	10.00							
	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.2	レボホリナート												
	生理食塩液 250mL	1本											
			A側管	持続点滴	2 時間	12:30							
				ויין אוליסלוי ניין	2 43(4)	12.00							
	オキサリプラチン投与終了2時間前よ					1 !							
	り開始												
Rp.3	オキサリプラチン												
	5% ブドウ糖液 250mL	1本											
			CV-A	持続点滴	4 時間	10:30							
			٠٠ /\	141 400 747 7101	1 89 (8)	10.00							
Rp.4	フルオロウラシル												
	生理食塩液 50mL	1本											
			CV-A	持続点滴	10 分	14:30							
				1.3.450,46,41-3	""	1							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本											
			CV-A	持続点滴	5 分	14:40							
	フルオロウラシル終了後												
	フラッシュ用												
Rp.6	フルオロウラシル	1 +	-										
1	生理食塩液 100mL	1本	-										
1			CV-A	持続点滴	46 時間	14:45							
	 シュアフューザーを使用し、												
	シュアフューザーを使用し、 合計140mLとする												
	TOUILE Y O								<u> </u>	ــــــــــــ	<u> </u>	igsquare	