

レジメン名: 外ア)BV/mFOLFOX6 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ベバシズマブ	5	5	mg/Kg
3	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
4	オキサリプラチン	85	85	mg/m <sup>2</sup>
5	フルオロウラシル	400	400	mg/m <sup>2</sup>
7	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		CV-A	持続点滴	90分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	CV-A	持続点滴	30分	11:30							
	ガスター 20mg	1A											
	ポラミン 5mg	1A											
	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能												
Rp.3	レボホリナート		A側管	持続点滴	2時間	14:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
	オキサリプラチン投与終了2時間前から開始												
Rp.4	オキサリプラチン		CV-A	持続点滴	4時間	12:00							
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
Rp.5	フルオロウラシル		CV-A	持続点滴	10分	16:00							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5分	16:10							
	フルオロウラシル終了後フラッシュ用												

