

レジメン名: 外)RAM/FOLFIRI 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	サイラムザ(ラムシルマブ)	8	8	mg/Kg
4	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
5	イリノテカン	150	150	mg/m <sup>2</sup>
6	フルオロウラシル	400	400	mg/m <sup>2</sup>
7	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	CV-A	持続点滴	30分	9:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	サイラムザ	1本	CV-A	持続点滴	1時間	9:30							
	生理食塩液 250mL												
	0.2または0.22μmのインラインフィルターを使用すること												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5分	10:30							
	サイラムザ投与後のフラッシュ用												
Rp.4	レボホリナート	1本	CV-A	持続点滴	2時間	10:35							
	生理食塩液 250mL												
	イリノテカンと同時に開始												
Rp.5	イリノテカン	1本	CV-B	持続点滴	2時間	10:35							
	生理食塩液 250mL												
	レボホリナートと同時に開始												
Rp.6	フルオロウラシル	1本	CV-A	持続点滴	10分	12:35							
	生理食塩液 50mL												

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	フルオロウラシル	1本	CV-A	持続点滴	46 時間	12:45							
	生理食塩液 100mL												
	シュアフューザーを使用し、計140mLとする。												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5 分	1回							
	フラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													