

レジメン名: 外アレ)Pmab/mFOLFOX6 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベクティビックス(パニツムマブ)	6	6	mg/Kg
3	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
4	オキサリプラチン	85	85	mg/m <sup>2</sup>
5	フルオロウラシル	400	400	mg/m <sup>2</sup>
6	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベクティビックス		指定なし	持続点滴	1 時間	9:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	0.2または0.22 μ mのインラインフィルター使用。												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	10:00							
	ガスター 20mg	1A											
	ポラミン 5mg	1A											
	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.3	レボホリナート		指定なし	持続点滴	2 時間	12:30							
	生理食塩液 250mL	1本											
	オキサリプラチン投与終了2時間前からレボホリナート開始。												
Rp.4	オキサリプラチン		指定なし	持続点滴	4 時間	10:30							
	5% ブドウ糖液 250mL	1本											
	オキサリプラチン投与終了2時間前からレボホリナート開始。												
Rp.5	フルオロウラシル		指定なし	持続点滴	10 分	14:30							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.6	フルオロウラシル		指定なし	持続点滴	46 時間	14:40							
	生理食塩液 100mL	1本											
	フルオロウラシル急速静注終了後に開始。シュアフューザーを使用し計140mLとする。												

