

レジメン名: 外)BV/FOLFOXIRI 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	5	5	mg/Kg
3	イリノテカン	150	150	mg/m <sup>2</sup>
4	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
5	オキサリプラチン	85	85	mg/m <sup>2</sup>
6	フルオロウラシル	3000	3000	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	ベバシズマブ		CV-A	持続点滴	90分	9:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	CV-A	持続点滴	30分	10:30							
	デキサート 1.65mg	2A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.3	イリノテカン		CV-A	持続点滴	1時間	11:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.4	レボホリナート		CV-A	持続点滴	2時間	12:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
	オキサリプラチンと同時に開始												
Rp.5	オキサリプラチン		CV-A	持続点滴	2時間	12:00							
	5%ブドウ糖液 250mL	1本											
	レボホリナートと同時に開始												
Rp.6	フルオロウラシル		CV-A	持続点滴	46時間	14:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	シュアフューザーを使用し、合計140mLとする。												

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5分	1回							
	フラッシュ用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													