レジメン名：　BV/IRIS 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	エスワンタイホウ(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
用法・用量	1回 40mg/m2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後 2週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	5	5	mg/Kg
3	イリノテカン	100	100	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	90 分	10:00	10:00						
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回投与は90分。問題なければ2回目は60分、それ以降は30分に短縮投与可能。												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:30	11:30						
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.3	イリノテカン		末梢A	持続点滴	90 分	12:00	12:00						
	生理食塩液 500mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	13:30	13:30						
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													