レジメン名: 5-FU/LV 大腸がん

【1コースの期間】 7日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

	7 17 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	レボホリナート	250	250	mg/m^2
3	フルオロウラシル	600	600	mg/m^2

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
'		-											
			+6 中 → 1	社结上 流	30 分	1回							
			指定なし	持続点滴	30 万	▎▕╙							
	1番目												
Rp.2	レボホリナート												
	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
			指定なし	持続点滴	2 時間	1回							
			1475.60	141 490 140 140	Z #1 [H]	'=							
	2番目		1										
	フルオロウラシル	4-4-											
	生理食塩液 50mL	1本	4				1						1
			指定なし	持続点滴	5 分	1回							
	3番目。レボホリナート開始1時間後に 投与。												
Dn 1	生理食塩液 50mL	1本											
η.4	土哇及塩次 3011112	174											
						_							
				処置用		1回							
	4番目。フラッシュ用												
	T田 口。フラフラエ/II												
Rp.5													
-													
Rp.6													