

レジメン名: FEC 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	エピルビシン	100	100	mg/m ²
4	エンドキサン(シクロホスファミド)	500	600	mg/m ²
5	フルオロウラシル	500	600	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.2	エピルビシン	1本	末梢A	持続点滴	15分	10:30							
	生理食塩液 50mL												
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:45							
	エピルビシン終了後のフラッシュ												
Rp.4	エンドキサン	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:50							
	生理食塩液 100mL												
Rp.5	フルオロウラシル	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:20							
	5% ブドウ糖液 100mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:50							
	フルオロウラシル終了後のフラッシュ												