

レジメン名: nab-PAC/GEM 膾がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	アブラキサン(パクリタキセル アルブミン懸濁型)	125	125	mg/m ²
4	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00					
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30	10:30	10:30					
	プライミング&フラッシュ用												
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:35	10:35	10:35					
	アブラキサン												
	・インラインフィルターは使用しない ・他薬剤や補液との配合または同じ 静注ラインでの同時注入は避ける												
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:10	11:10	11:10					
	ゲムシタビン												
Rp.5													
Rp.6													