レジメン名：　外)nal-IRI/FU/l-LV 膵がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	オニバイド(イリノテカン塩酸塩水和物)	70	70	mg/㎡
3	レボホリナート	200	200	mg/㎡
4	フルオロウラシル	2400	2400	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	CV-A	持続点滴	30 分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	オニバイド		CV-A	持続点滴	90 分	10:30							
	生理食塩液 500mL	1本											
	インラインフィルターを使用しないこと。												
Rp.3	レボホリナート		CV-A	持続点滴	2 時間	12:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.4	フルオロウラシル		CV-A	持続点滴	46 時間	14:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	シュアフューザーを使用し、計140mLに調製。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5 分	1回							
	レボホリナート終了後のフラッシュ用												
Rp.6													