

レジメン名: Atezo/BV 維持

【1コースの期間】

| | |
|----------|-----|
| インターバル日数 | 21日 |
|----------|-----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|-----------------|------|------|---------|
| 1 | テセントリク(アテゾリズマブ) | 1200 | 1200 | mg/body |
| 2 | ペバシズマブ | 15 | 15 | mg/Kg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|------|---------------------------|-------|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | テセントリク | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 9:00 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | | | | | | | | | | | | |
| | 0.22 μmのインラインフィルターを使用すること | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | ペバシズマブ | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 9:30 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 10:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |