

レジメン名: 外)RT併用/mFOLFOX6 食道がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
3	オキサリプラチン	85	85	mg/m <sup>2</sup>
4	フルオロウラシル	400	400	mg/m <sup>2</sup>
5	フルオロウラシル	1600	1600	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	CV-A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	レボホリナート	1本	CV-A	持続点滴	2時間	10:30							
	生理食塩液 250mL												
	オキサリプラチンと同時に開始												
Rp.3	オキサリプラチン	1本	A側管	持続点滴	2時間	10:30							
	5%ブドウ糖液 250mL												
	レボホリナートと同時に開始												
Rp.4	フルオロウラシル	1本	CV-A	持続点滴	10分	12:30							
	生理食塩液 50mL												
Rp.5	フルオロウラシル	1本	CV-A	持続点滴	46時間	12:40							
	生理食塩液 100mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	フルオロウラシル急速静注終了後のフラッシュ用												