

レジメン名: Cmab/CPT-11(初回) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	49日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	400	400	mg/m ²
5	イリノテカン	150	150	mg/m ²
7	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	指定なし	ワンショット静注		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	
	アービタックス投与前に実施。												
Rp.2	アービタックス 生理食塩液 250mL	1本	指定なし	持続点滴	2 時間	10:00							
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	指定なし	持続点滴		12:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でフラッシュ												
Rp.4	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	12:30		11:30	11:30				
	デキサート 6.6mg	1V											
	アービタックス投与終了後30分経過してから開始												
Rp.5	イリノテカン 5% ブドウ糖液 250mL	1本	指定なし	持続点滴	90 分	13:00		12:00	12:00				
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	5 分	14:30		13:30	13:30				
	イリノテカン投与後、フラッシュ用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 15	Day 22	Day 22	Day
Rp.7	アービタックス	1本	指定なし	持続点滴	1 時間		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
	生理食塩液 250mL												
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Cmab/CPT-11(2回目以降) 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	49日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	250	250	mg/m ²
5	イリノテカン	150	150	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	1A	指定なし	ワンショット静注		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	
	アービタックス投与前に実施。												
Rp.2	アービタックス 生理食塩液 250mL	1本	指定なし	持続点滴	1 時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
	アービタックス投与後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	指定なし	持続点滴		11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
	アービタックス投与後、アービタックス投与時と同速度でラインフラッシュ												
Rp.4	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	11:30		11:30		11:30			
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.5	イリノテカン 5% ブドウ糖液 250mL	1本	指定なし	持続点滴	90 分	12:00		12:00		12:00			
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	5 分	13:30		13:30		13:30			
	イリノテカン投与後、フラッシュ用												