

レジメン名: 外)BV/FOLFIRI 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	5	5	mg/Kg
3	レボホリナート	200	200	mg/m <sup>2</sup>
4	イリノテカン	150	150	mg/m <sup>2</sup>
5	フルオロウラシル	400	400	mg/m <sup>2</sup>
7	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	ベバシズマブ 生理食塩液 100mL	1本	CV-A	持続点滴	90分	10:00							
	初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能												
Rp.2	パロノセトロンパップ 0.75mg/50mL デキサート 6.6mg	1本 1V	CV-A	持続点滴	30分	11:30							
Rp.3	レボホリナート 生理食塩液 250mL	1本	CV-A	持続点滴	2時間	12:00							
	イリノテカンと同時に開始												
Rp.4	イリノテカン 生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	2時間	12:00							
	レボホリナートと同時に開始												
Rp.5	フルオロウラシル 生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	10分	14:00							
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	CV-A	持続点滴	5分	14:10							
	フルオロウラシル後フラッシュ用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	フルオロウラシル		CV-A	持続点滴	46 時間	14:15							
	生理食塩液 100mL	1本											
	シユアフューザーを使用し、 合計140mLとする												
Rp.6													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													