レジメン名： GEM/CBDCA 尿路上皮がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ゲムシタビン	1000	1000	mg/㎡
5	カルボプラチン	AUC 5	750	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分	10:00		10:00	10:00				
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ゲムシタビン		末梢A	持続点滴	30 分	10:30		10:30	10:30				
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:00	11:30	11:00	11:00				
	フラッシュ用												
Rp.4	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分		10:00						
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.5	カルボプラチン		末梢A	持続点滴	1 時間		10:30						
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.6													