

レジメン名: BV/GEM

【1コースの期間】

| | |
|----------|-----|
| インターバル日数 | 21日 |
|----------|-----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|---------------|------|------|-------------------|
| 2 | ゲムシタビン | 1000 | 1000 | mg/m ² |
| 4 | アバステン(ペバシズマブ) | 15 | 15 | mg/Kg |
| | | | | |
| | | | | |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day 8 | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|------|--|-------|------|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | 1V | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 10:00 | 10:00 | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | ゲムシタビン | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 10:30 | 10:30 | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 11:00 | 11:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | アバステン | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 90分 | 11:05 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | 初回90分、問題なければ2回目は60分、問題なければそれ以降は30分で短縮投与可能。 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 12:35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |