

レジメン名: BV/PLD 卵巣がん

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドキシル(ドキソルビシン)	30	30	mg/m <sup>2</sup>
4	アバスチン(ベバシズマブ)	15	15	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	5%ブドウ糖液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	2時間	10:30							
	ドキシル												
	フィルター使用不可。												
Rp.3	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30							
	ドキシル終了後のフラッシュ用												
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	90分	12:35							
	アバスチン												
	初回90分、問題なければ2回目は60分、問題なければそれ以降は30分で短縮投与可能。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	14:05							
	アバスチン終了後のフラッシュ用												
Rp.6													