

レジメン名: BV/TC 卵巣がん(180/AUC=6)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	パクリタキセル	180	180	mg/m <sup>2</sup>
4	カルボプラチン	AUC 6	900mg	
5	アバスチン(ベバシズマブ)	15	15	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day							
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00								
	デキサート 6.6mg	2V												
	デキサート 1.65mg	2A												
	ガスター 20mg	1A												
	ポララミン 5mg	1A												
	パクリタキセルの60分前に開始													
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30								
	パクリタキセルの30分前に開始													
Rp.3	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	3時間	11:00								
	生理食塩液 500mL													
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること													
Rp.4	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	14:00								
	生理食塩液 250mL													
Rp.5	アバスチン	1本	末梢A	持続点滴	90分	15:00								
	生理食塩液 100mL													
	初回90分で投与、問題なければ2回目以降は60分、それ以降は30分で投与可能													
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	16:30								
	フラッシュ用													