

レジメン名: PAC/IFM 婦人科がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	パクリタキセル	135	135	mg/m ²
6	イホマイド(イホスファミド)	1.6	1.6	g/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	指定なし	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.2	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	指定なし	持続点滴	30分	10:30							
Rp.3	パクリタキセル	1本	指定なし	持続点滴	3時間	11:00							
	生理食塩液 500mL												
	必ず0.22μm以下のインラインフィルターを使用すること。												
Rp.4	ウロミテキサン 400mg	600mg	A側管	持続点滴	15分	14:00 18:00 22:00	14:00 18:00 22:00	14:00 18:00 22:00					
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.5	生理食塩液 1000mL	1000mL	指定なし	持続点滴	24時間	14:00	14:00	14:00					
	5%ブドウ糖液 500mL	1500mL											
	メイロン 8.4% 250mL	150mL											
Rp.6	イホマイド	1本	A側管	持続点滴	1時間	14:15	14:15	14:15					
	生理食塩液 100mL												

