

レジメン名: (6w毎)Pembro/GEM/CBDCA 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	42日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400	400	mg/body
3	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²
4	カルボプラチン	AUC 2	AUC 2	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 22	Day 29	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ 生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	9:00							
	投与時0.22μm以下のインライン フィルターを使用すること。												
Rp.2	グラニセロンバッグ 3mg/50mL デキサート 6.6mg	1本 1V	末梢A	持続点滴	30分	9:30	9:30	9:30	9:30				
Rp.3	ゲムシタビン 生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00	10:00				
Rp.4	カルボプラチン 生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	60分	10:30	10:30	10:30	10:30				
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:30	11:30	11:30	11:30				
	フラッシュ用												
Rp.6													