

レジメン名: (3w毎)Pembro/PAC 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	84日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	パクリタキセル	90	90	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36	Day 43	Day 50
Rp.1	キイトルーダ 生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	9:00				9:00		9:00	
	投与時0.22μm以下のインライン フィルターを使用すること。												
Rp.2	グラニセトンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	9:30	9:30	9:30		9:30	9:30	9:30	
	デキサート 6.6mg	1V											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.3	パクリタキセル 生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	60分	10:00	10:00	10:00		10:00	10:00	10:00	
	投与時0.22μm以下のインライン フィルターを使用すること。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:00	11:00	11:00	9:30	11:00	11:00	11:00	
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													

【投与スケジュール・タイムテーブル】

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 57	Day 64	Day 71	Day 78	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ	1本	末梢A	持続点滴	30分		9:00						
	生理食塩液 100mL												
	投与時0.22μm以下のインラインフィルターを使用すること。												
Rp.2	グラニセトンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	9:30	9:30	9:30					
	デキサート 6.6mg	1V											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.3	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	60分	10:00	10:00	10:00					
	生理食塩液 250mL												
	投与時0.22μm以下のインラインフィルターを使用すること。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:00	11:00	11:00					
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													