

レジメン名: GEM/PAC 尿路上皮がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	パクリタキセル	200	200	mg/m ²
5	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	30分	9:30							
	ガスター 20mg	1A											
	ポラミン 5mg	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
Rp.3	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30分		10:00	10:00					
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.4	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	3時間	10:30							
	生理食塩液 500mL												
	0.22μmのインラインフィルター付 ルートにて投与すること												
Rp.5	ゲムシタビン	1本	末梢A	持続点滴	30分	13:30	10:30	10:30					
	生理食塩液 100mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	14:00	11:00	11:00					
	フラッシュ用												