レジメン名：　BV(90分)/PEM(維持) 肺がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ペメトレキセド	500	500	mg/㎡
4	ベバシズマブ	15	15	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	1回							
	ベバシズマブ投与時間により残破棄可												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	A側管	持続点滴	20 分	1回							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.3	ペメトレキセド		A側管	持続点滴	10 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.4	ベバシズマブ		A側管	持続点滴	90 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
	ペメトレキセド投与後												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	フラッシュ用												
Rp.6													

レジメン名：　BV(60分)/PEM(維持) 肺がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ペメトレキセド	500	500	mg/㎡
4	ベバシズマブ	15	15	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	1回							
	ベバシズマブ投与時間により残破棄可												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	A側管	持続点滴	20 分	1回							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.3	ペメトレキセド		A側管	持続点滴	10 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.4	ベバシズマブ		A側管	持続点滴	60 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
	ペメトレキセド投与後												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	フラッシュ用												
Rp.6													

レジメン名：　BV(30分)/PEM(維持) 肺がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ペメトレキセド	500	500	mg/㎡
4	ベバシズマブ	15	15	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	2 時間	1回							
	ベバシズマブ投与時間により残破棄可												
Rp.2	デキサート 6.6mg	1V	A側管	持続点滴	20 分	1回							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.3	ペメトレキセド		A側管	持続点滴	10 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.4	ベバシズマブ		A側管	持続点滴	30 分	1回							
	生理食塩液 100mL	1本											
	ペメトレキセド投与後												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	フラッシュ用												
Rp.6													