# レジメン名： BV(90分)/PEM(維持)(80%) 肺がん

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 21日 |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ペメトレキセド(ペメトレキセド) | 400 | 500 | mg/㎡ |
| 4 | ベバシズマブ | 15 | 15 | mg/Kg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 250mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 2 時間 | 1回 | | | | | | | |
| | ベバシズマブ投与時間により残破棄可 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | 1V | A側管 | 持続点滴 | 20 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | ペメトレキセド | | A側管 | 持続点滴 | 10 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | ベバシズマブ | | A側管 | 持続点滴 | 90 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| | ペメトレキセド投与後 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | 1回 | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン名： BV(60分)/PEM(維持)(80%) 肺がん

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 21日 |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ペメトレキセド(ペメトレキセド) | 400 | 500 | mg/㎡ |
| 4 | ベバシズマブ | 15 | 15 | mg/Kg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 | (単位) | Day 1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 250mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 2 | 時間 | 1回 | | | | | | | |
| | ベバシズマブ投与時間により残破棄可 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | 1V | A側管 | 持続点滴 | 20 | 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | ペメトレキセド | | A側管 | 持続点滴 | 10 | 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | ベバシズマブ | | A側管 | 持続点滴 | 60 | 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | | |
| | ペメトレキセド投与後 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | | 1回 | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | | |

# レジメン名： BV(30分)/PEM(維持)(80%) 肺がん

## 【1コースの期間】

| | |
|---|---|
| インターバル日数 | 21日 |

## 【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ペメトレキセド(ペメトレキセド) | 400 | 500 | mg/㎡ |
| 4 | ベバシズマブ | 15 | 15 | mg/Kg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 【内服の抗がん剤】

| | |
|---|---|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

## 【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度 (単位) | Day 1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | 生理食塩液 250mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 2 時間 | 1回 | | | | | | | |
| | ベバシズマブ投与時間により残破棄可 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | 1V | A側管 | 持続点滴 | 20 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | ペメトレキセド | | A側管 | 持続点滴 | 10 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | ベバシズマブ | | A側管 | 持続点滴 | 30 分 | 1回 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| | ペメトレキセド投与後 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | | | | 1回 | | | | | | | |
| | フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | | | | | | | | | | | | | |