

レジメン名: Pola/BR(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m <sup>2</sup>
5	ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)	1.8	1.8	mg/Kg
8	トレアキシシン(ペンダムスチン)	90	90	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ソルコーテフ 100mg/V	1V	末梢A	ワンショット静注		10:00	10:00						
	リツキシマブ又はポライビー投与開始30分前に実施.												
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00	10:00						
	リツキシマブ又はポライビー投与開始30分前に実施.												
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	14:30							
	リツキシマブ終了後のフラッシュ、投与後の経過観察用												
Rp.5	ポライビー	1A	末梢A	持続点滴	90分		10:30						
	注射用水20mL												
Rp.6	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		12:30	10:00					

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	5% ブドウ糖液 50mL	1本	A側管	持続点滴	10 分		13:00	10:30					
Rp.8	トレアキシン 生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分		13:00	10:30					
	調製後、6時間以内に投与を終了すること。												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分		13:10	10:40					
	トレアキシン終了後のフラッシュ用												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Pola/BR(2サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m <sup>2</sup>
5	ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)	1.8	1.8	mg/Kg
8	トレアキシン(ペンダムスチン)	90	90	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

Rp	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ソルコーテフ 100mg/V	1V	末梢A	フンシヨット静注		10:00							
	リツキシマブ又はポライビー投与開始30分前に実施.												
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	フンシヨット静注		10:00							
	リツキシマブ投与開始30分前に実施.												
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	14:30 15:30							
	リツキシマブ,ポライビー終了後のフラッシュ, 投与後の経過観察用												
Rp.5	ポライビー	1A	末梢A	持続点滴	30分	15:00							
	注射用水20mL 生理食塩液 100mL	1本											
Rp.6	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	16:00	10:00						

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day	
Rp.7	5% ブドウ糖液 50mL	1本	A側管	持続点滴	10 分	16:30	10:30							
Rp.8	トリアキシン 生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	16:30	10:30							
	調製後、6時間以内に投与を終了すること。													
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	16:40	10:40							
	トリアキシン終了後のフラッシュ用													
Rp.10														
Rp.11														
Rp.12														