

レジメン名: 3wPembro/AC 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	ドキシソルビシン	60	60	mg/m <sup>2</sup>
5	エンドキサン(シクロホスファミド)	600	600	mg/m <sup>2</sup>

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ		末梢A	持続点滴	30分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
	投与时、インラインフィルター(0.2-5 μm)を使用すること。												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1本											
	デキサート 1.65mg	2A											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.3	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
	前投薬終了後のフラッシュ用												
Rp.4	ドキシソルビシン		末梢A	持続点滴	15分	10:35							
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.5	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:50							
	ドキシソルビシン投与後のフラッシュ用												
Rp.6	エンドキサン		末梢A	持続点滴	30分	10:55							
	生理食塩液 100mL	1本											

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:25							
	エンドキサン投与後のフラッシュ用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													