レジメン名：　3wPembro/PAC/wCBDCA 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	パクリタキセル	80	80	mg/㎡
4	カルボプラチン	AUC 1.5	AUC 1.5	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ		末梢A	持続点滴	30 分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
	投与時、インラインフィルター(0.2-5μm)を使用すること。												
Rp.2	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00					
	デキサート 6.6mg	1本											
	ポララミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
Rp.3	パクリタキセル		末梢A	持続点滴	60 分	10:30	10:30	10:30					
	生理食塩液 250mL	1本											
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること												
Rp.4	カルボプラチン		末梢A	持続点滴	60 分	11:30	11:30	11:30					
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:30	12:30	12:30					
	フラッシュ用												
Rp.6													