

レジメン名: 3wPembro/wPAC/3wCBDCA 乳がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
4	パクリタキセル	80	80	mg/m ²
5	カルボプラチン	AUC 5	AUC 5	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ		末梢A	持続点滴	30分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	投与時、インラインフィルター(0.2-5 μm)を使用すること。		末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	デキサート 6.6mg	1本											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.3	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00	10:00	10:00					
	デキサート 6.6mg	1本											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
Rp.4	パクリタキセル		末梢A	持続点滴	60分	10:30	10:30	10:30					
	生理食塩液 250mL	1本											
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること												
Rp.5	カルボプラチン		末梢A	持続点滴	60分	11:30							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30	11:30	11:30					
	フラッシュ用												