

レジメン名: Pembro/TC 子宮頸がん(175/AUC=5)

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	パクリタキセル	175	175	mg/m ²
4	カルボプラチン	AUC=5	750mg	/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	2V	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
	ガスター 20mg	1A											
	ボラミン 5mg	1A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.2	キイトルーダ	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30							
	生理食塩液 100mL												
	投与時、インラインフィルター(0.2-5μm)を使用すること。												
Rp.3	パクリタキセル	1本	末梢A	持続点滴	3時間	11:00							
	生理食塩液 500mL												
	必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること												
Rp.4	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	14:00							
	生理食塩液 250mL												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	1時間	15:00							
	投与後のフラッシュ用												
Rp.6													