

レジメン名: Pembro/TC/BV 子宮頸がん

【1コースの期間】

| | |
|----------|-----|
| インターバル日数 | 21日 |
|----------|-----|

【内服の抗がん剤】

| | |
|----------|--|
| 商品名(一般名) | |
| 用法・用量 | |
| 投与スケジュール | |

【注射の抗がん剤】

| Rp No. | 商品名(一般名) | 標準量 | 上限量 | 単位 |
|--------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 2 | キイトルーダ(ペムブロリズマブ) | 200 | 200 | mg/body |
| 3 | パクリタキセル | 175 | 175 | mg/m ² |
| 4 | カルボプラチン | AUC=5 | 750mg | /body |
| 5 | アバスチン(ベバシズマブ) | 15 | 15 | mg/Kg |

【投与スケジュール・タイムテーブル】

| | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与経路 | 手技 | 投与速度(単位) | Day 1 | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day |
|------|----------------------------------|-------|------|------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | 2V | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 10:00 | | | | | | | |
| | デキサート 1.65mg | 2A | | | | | | | | | | | |
| | ガスター 20mg | 1A | | | | | | | | | | | |
| | ボラミン 5mg | 1A | | | | | | | | | | | |
| | パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL | 1本 | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | キイトルーダ | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 30分 | 10:30 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | 投与時、インラインフィルター(0.2-5μm)を使用すること。 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.3 | パクリタキセル | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 3時間 | 11:00 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 500mL | | | | | | | | | | | | |
| | 必ず0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること | | | | | | | | | | | | |
| Rp.4 | カルボプラチン | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 1時間 | 14:00 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 250mL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.5 | アバスチン | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 90分 | 15:00 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | 初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.6 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 末梢A | 持続点滴 | 5分 | 16:30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与後のフラッシュ用 | | | | | | | | | | | | |