

レジメン名: BV/XELOX 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ゼローダ(カペシタビン)
用法・用量	1回 1000mg/m ² ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後1週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	7.5	7.5	mg/Kg
3	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	90分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可能												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:30							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.3	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	2時間	12:00							
	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	14:00							
	オキサリプラチン終了後フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													