レジメン名： BV/XELIRI 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ゼローダ（カペシタビン）
用法・用量	1回800mg/m^2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	Day1夕食後～Day15朝食後まで内服、その後1週間休薬

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	7.5	7.5	mg/Kg
3	イリノテカン	150	150	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回90分投与、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮投与可能。												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:30							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.3	イリノテカン		末梢A	持続点滴	90 分	12:00							
	生理食塩液 500mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	13:30							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													