レジメン名：　　ｱﾚﾙｷﾞｰ)BV/SOX 大腸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ベバシズマブ	7.5	7.5	mg/Kg
3	オキサリプラチン	130	130	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	エスワンタイホウ(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
用法・用量	1回 40mg/m2 ・ 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服し、その後 1週間休薬

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ベバシズマブ		末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	初回投与は90分。問題なければ2回目は60分、それ以降は30分に短縮投与可能。												
Rp.2	アロカリス 235mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	ガスター 20mg	1A											
	ポララミン 5mg	1A											
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.3	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	4 時間	11:00							
	5% ブドウ糖液 500mL	1本											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:00							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													