

レジメン名: Nivo/XELOX 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法・用量	1000mg/m ² /回 1日2回 朝夕食後
投与スケジュール	2週間連日内服しその後1週間休薬する。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	オプジーボ(ニボルマブ)	360	360	mg/body
3	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	オプジーボ		末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
	0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用すること												
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.3	オキサリプラチン		末梢A	持続点滴	2時間	11:00							
	5%ブドウ糖液 500mL	1本											
Rp.4	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:00							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													