レジメン名：　(2w毎) Zolbetuximab単剤 (2回目以降) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	14日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ビロイ(ゾルベツキシマブ)	400	400	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本	指定なし	持続点滴	30 分	1回							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	5 分	1回							
	プレメディフラッシュ用												
Rp.3	ビロイ		指定なし	持続点滴	4.5 時間	1回							
	生理食塩液 250mL	1本											
	投与開始から30～60分後までは50mg/m2/時で投与し、その後は100～200mg/m2/時で投与が可能。2.0mg/mLとなるように生理食塩液												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	指定なし	持続点滴	5 分	1回							
	ビロイフラッシュ用												
Rp.5	注射用水 100mL	1本	指定なし	処置用		1回							
	ビロイ調製用												
Rp.6													