

インターバル日数	21日
----------	-----

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ベンダムスチン	120	120	mg/m ²
6	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	5% ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	10:30	10:30						
Rp.2	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	A側管	持続点滴	30 分	10:00	10:00						
Rp.3	ベンダムスチン 生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	10 分	10:30	10:30						
	調製後6時間以内に投与終了すること。												
Rp.4	ブレドニン(水溶性) 20mg	1A	A側管	持続点滴	30 分	10:40							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.5	ポララミン 5mg	1A	A側管	ワンショット静注		10:40							
Rp.6	リツキシマブBS		A側管	持続点滴	50 mL/h	10:40							
	生理食塩液 500mL	1本											
	初回投与時、最初の30分は50mL/hの速度で開始、問題なければ30分毎に50mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本				1回	1回						
	ベンダムスチン終了後のフラッシュ用												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	リツキシマブ終了後のフラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本				1回	1回						
	ベンダムスチン終了後のフラッシュ用												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	リツキシマブ終了後のフラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本				1回	1回						
	ベンダムスチン終了後のフラッシュ用												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本				1回							
	リツキシマブ終了後のフラッシュ用												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													