

レジメン名: 【初回】BV(q2w)/PLD(40) 卵巣がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドキシル(ドキソルビシン)	40	40	mg/m ²
4	アバステン(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	5%ブドウ糖液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	2時間	10:30							
	ドキシル												
	フィルター使用不可。												
Rp.3	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30							
	ドキシル終了後のフラッシュ用												
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	90分	12:35							
	アバステン												
	初回90分、問題なければ2回目は60分、問題なければそれぞれ降は30分で短縮投与可能。												
Rp.5	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	60分	12:35							
	アバステン												
	初回90分、問題なければ2回目は60分、問題なければそれぞれ降は30分で短縮投与可能。												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	14:05	13:35						
	アバステン終了後のフラッシュ用												

レジメン名: 【2回目以降】BV(q2w)/PLD(40) 卵巣がん

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ドキシル(ドキソルビシン)	40	40	mg/m ²
4	アバステン(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.2	5%ブドウ糖液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	2時間	10:30							
	ドキシル												
	フィルター使用不可。												
Rp.3	5%ブドウ糖液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30							
	ドキシル終了後のフラッシュ用												
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:35	12:35						
	アバステン												
	初回90分、問題なければ2回目は60分、問題なければそれぞれ以降は30分で短縮投与可能。												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:05	13:05						
	アバステン終了後のフラッシュ用												
Rp.6													