レジメン名:

Isa-Pd(1サイクル目)

【1コースの期間】 28

【内服の抗がん剤】

R. Dibbara Bara	
商品名(一般名)	ポマリスト(ポマリドミド)・ デキサメタゾン
	ポマリスト: 4mg/日(3週内服しその後1週間休薬) デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週)、点滴と内服で併せて
投与スケジュール	ケイケスメング: 40mg/ 週(70歳以上は20mg/ 週/、点周と内服で併せて 施行されるためよく確認すること。

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4				
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
	デキサート 6.6mg	3V											
	ポララミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	生理食塩液 50mL	1本	SISTEM	1.1 (196)((. (10)	10 /3	10.00	10.00	10.00	10.00				
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15	10:15	10:15				
	サークリサ												
	生理食塩液 250mL	1本			25 mL/h	10:30							
	・投与開始60分まで25ml/hで、以降30分毎に		末梢A	持続点滴									
	25ml/hずつ速度をあげて最大150ml/hまで												
	・0.22 µ m以下のフィルターを使用・総量250mLに調製												
Rp.4	サークリサ				50 mL/h		10:30						
'	生理食塩液 250mL	1本											
	・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開		末梢A	持続点滴									
	始後60分まで100ml/h、それ以降は最大 200ml/hまで		不怕人	行机出向	JU IIIL/II								
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用												
	・総量250mL/こ調製												
	サークリサ												
	生理食塩液 250mL	1本											
	000 · NT 07 · 1 6 · ##		末梢A	持続点滴	200 mL/h			10:30	10:30				
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用・総量250mLに調製												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本											
			 ±>\/. A	加墨田		10.50	10.00	44.45	5 11:45				
			末梢A	処置用		13:50	12:23	11:45					
	サークリサ投与後のフラッシュ用												

レジメン名: Isa-Pd(2サイクル目以降)(75分投与)

【1コースの期間】 28

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ポマリスト(ポマリドミド)・ デキサメタゾン
	ポマリスト: 4mg/日(3週内服しその後1週間休薬) デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週)、点滴と内服で併せて
投与スケジュール	プイッグメング:40mg/週(70歳以上は20mg/週)、点洞と内臓で併せて 施行されるためよく確認すること。

【注射の抗がん剤】

	7 17 676 7 67 [1]			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V											
	ポララミン 5mg	1A				1	10:00						
	ガスター 20mg	1A	末梢A	持続点滴	15 分	10:00							
	生理食塩液 50mL	1本	ሉነክላ	可吸流向	10 /J	10.00	10.00						
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15						
Rp.3	サークリサ												
	生理食塩液 250mL	1本											
		·											
			末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30	10:30						
	・0.22 µ m以下のフィルターを使用												
	・総量250mLに調製												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本				11:45	.5 11:45						
								11:45					
			末梢A	処置用									
			21411374	~ [27]		11.10							
	サークリサ投与後のフラッシュ												
D -	用						ļ						
Rp.5													
			-										
Rp.6													
1			1										

レジメン名: Isa-Pd(2サイクル目以降)(113分投与)

【1コースの期間】 28

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ポマリスト(ポマリドミド)・ デキサメタゾン
	ポマリスト: 4mg/日(3週内服しその後1週間休薬) デキサメタゾン: 40mg/週(75歳以上は20mg/週)、点滴と内服で併せて
投与スケジュール	アイックメノン:40mg/週1/13歳以上は20mg/週/、点周と内服で併せて 施行されるためよく確認すること。

【注射の抗がん剤】

<u></u>	2 37 0 7 0 7 1 3 2			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V											
	ポララミン 5mg	1A					10.00						
	ガスタ― 20mg	1A	」 +× v	++ ++ + :·	15 分	10.00							
	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	19.27	10:00	10:00						
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A										
				持続点滴	15 分	10:15	10:15						
Rp.3	サークリサ												
	生理食塩液 250mL	1本											
	·投与開始30分まで50ml/hで投		末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30	10:30	H30					
	与。その後開始後60分まで 100ml/h、それ以降は最大		NO IDA	1-1 100 110 110	00 IIIL/ II								
	200ml/hまで												
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用・総量250mLに調製												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		12:23	12:23						
			NIH.	20071									
	サークリサ投与後のフラッシュ 用												
Rp.5													
Rp.6													
									1				