

レジメン名: Isa-d(1サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週(75歳以上は20mg/週も可、その際は内服のDEX不要)
投与スケジュール	Day1,8,15,22:19.8mg(点滴で実施) Day2,9,16,23:20mg(内服で実施)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
5	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
6	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
7	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
8	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	ポララミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15	10:15	10:15				
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	25 mL/h	10:30							
	生理食塩液 250mL												
	・投与開始60分まで25ml/hで、以降30分毎に25ml/hずつ速度をあげて最大150ml/hまで ・0.22 μ m以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製												
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	150 mL/h	13:50							
	生理食塩液 250mL												
	Rp.3の投与終了後から続けて投与												
Rp.5	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h		10:30						
	生理食塩液 250mL												
	・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開始後60分まで100ml/h、それ以降は最大200ml/hまで ・0.22 μ m以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製												
Rp.6	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h		12:23						
	生理食塩液 250mL												
	Rp.5の投与終了後から続けて投与												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.7	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h			10:30	10:30				
	生理食塩液 250mL												
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用												
	・総量250mLに調製												
Rp.8	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h			11:45	11:45				
	生理食塩液 250mL												
	Rp.7の投与終了後から続けて投与												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		15:30	13:38	13:00	13:00				
	サークリサ投与後のフラッシュ用												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

インターバル日数	28
----------	----

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週(75歳以上は20mg/週も可、その際は内服のDEX不要)
投与スケジュール	Day1,8,15,22: 19.8mg(点滴で実施) Day2,9,16,23: 20mg(内服で実施)

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度I (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00						
	ポララミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15						
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	10:30	10:30						
	生理食塩液 250mL												
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用 ・総量250mLに調製												
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	11:45	11:45						
	生理食塩液 250mL												
	Rp.5の投与終了後から続けて投与												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		1回	1回						
	サークリサ投与後のフラッシュ用												
Rp.6													

インターバル日数	28
----------	----

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週(75歳以上は20mg/週も可、その際は内服のDEX不要)
投与スケジュール	Day1,8,15,22: 19.8mg(点滴で実施) Day2,9,16,23: 20mg(内服で実施)

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度 I (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00						
	ボラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15						
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30	10:30						
	生理食塩液 250mL												
	・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開始後60分まで100ml/h、それ以降は最大200ml/hまで ・0.22 μ m以下のフィルターを使用												
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	12:23	12:23						
	生理食塩液 250mL												
	Rp.5の投与終了後から続けて投与												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		13:38	13:38						
	サークリサ投与後のフラッシュ用												
Rp.6													