

インターバル日数	28
----------	----

商品名(一般名)	レナデックス(デキサメタゾン)
用法・用量	40mg/週(75歳以上は20mg/週も可、その際は内服のDEX不要)
投与スケジュール	Day1,8,15,22: 19.8mg(点滴で実施) Day2,9,16,23: 20mg(内服で実施)

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg
4	サークリサ(イサツキシマブ)	10	10	mg/Kg

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度I (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00						
	ボラミン 5mg	1A											
	ガスター 20mg	1A											
	生理食塩液 50mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:15	10:15						
Rp.3	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30	10:30						
	生理食塩液 250mL												
	・投与開始30分まで50ml/hで投与。その後開始後60分まで100ml/h、それ以降は最大200ml/hまで												
	・0.22 μ m以下のフィルターを使用												
	・総量250mLに調製												
Rp.4	サークリサ	1本	末梢A	持続点滴	200 mL/h	12:23	12:23						
	生理食塩液 250mL												
	Rp.5の投与終了後から続けて投与												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	処置用		13:38	13:38						
	サークリサ投与後のフラッシュ用												
Rp.6													