

レジメン名 : Nivo/GEM/CBDCA 尿路上皮がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日間
----------	------

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	オプジーボ(ニボルマブ)	360	360	mg/body
4	ゲムシタビン	1000	1000	mg/m ²
5	カルボプラチン	AUC 5	750	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 8	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	9:30							
	オプジーボ	240mg											
	オプジーボ	120mg											
Rp.2	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	11:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:30	11:30						
	ゲムシタビン												
	30分で投与を完了すること												
Rp.5	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	11:00							
	生理食塩液 250mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:00	12:00						
	フラッシュ用												