レジメン名:

Obinutuzumab+Acalabrutinib (1コース目)

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カルケンス(アカラブルチニブ)
用法•用量	1回100mg 1日2回
投与スケジュール	連日投与

【注射の抗がん剤】

	7 17 10 7 0 7 13 2			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
5	ガザイバ(オビヌツズマブ)	100	100	mg/body
6	ガザイバ(オビヌツズマブ)	900	900	mg/body
7	ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000	1000	mg/body

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 5	Day 6	Day 7	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本		1			40.00						
				++ ++ + :-	20 ()	10.00		10.00	40.00				
			末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00	10:00	10:00				
	ガザイバ投与60分前までに投与	- - - 終了											
	ポララミン 5mg	1A											
			末梢A	ンショット静		10:30	10:30	10:30	10:30				
			不怕人	ノンヨット時		10.30	10.30	10.30	10.30				
	ガザイバ投与の30分以上前												
Rp.3	アセリオバッグ 1000mg/100ml	600mg											
								10:30 10:30	10:30				
			末梢A	持続点滴	15 分	10:30	10:30						
			不怕人	行的品向	13 /]	10.30	10.30	10.30	10.30				
	ガザイバ投与の30分以上前												
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本											
					45 分	10:45 10		10:45	10:45				
			末梢A	持続点滴			10:45						
			木竹A	持枕品尚									
	ガザイバ投与前に45分かけて	点滴静注											
	ガザイバ												
	生理食塩液 100mL	96mL											
			末梢A	持続点滴	25 mL/h	11:30							
	U.ZZ μ mのインフィンフィルター 付きルートを用いること。		不怕人	行的品向	ZJ IIIL/II	11.30							
	25mL/hで開始し、最大												
	100ml /hまで上げられる												
Rp.6	ガザイバ												
	生理食塩液 250mL	214mL											
	0.22 μ mのインラインフィルター		末梢A	持続点滴	13.9 mL/h		11:30						
	付きルートを用いること。		W.IBV	1寸 씨사 제시의	10.5 IIIL/II		11.00						
	13.9mL/hで開始し、最大												
	111.1mL/hまで上げられる												

	与人ケンュール *ダイ 薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.7	ガザイバ				·								
	生理食塩液 250mL	210mL											
	0.22 μ mのインラインフィルター		末梢A	持続点滴	25 mL/h			11:30	11:30				
	付きルートを用いること。		, ,,,,,,,	13 450 / (1-3	202,								
	25mL/hで開始し、最大 100mL/hまで上げられる												
D 0		1-					ļ	ļ			ļ		
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	30 分	1回	1回	1回	1回				
	ガザイバ投与後の経過観察の	L ため30分で投与											
Rp.9	22.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	12470073 (1)											
Rp.10													
- 44													
Rp.11													
			-										
			-										
Rp.12													
, .ρ. ι 2													
			1										
			1										
			1	1			1	1			1		

<u>レジメン名:</u>

Obinutuzumab+Acalabrutinib(2-6コース目)

【1コースの期間】 28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カルケンス(アカラブルチニブ)
用法•用量	1回100mg 1日2回
投与スケジュール	連日投与

【注射の抗がん剤】

	37610 107132			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
5	ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000	1000	mg/body

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day 5	Day 6	Day 7	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	3V											
	生理食塩液 50mL	1本											
			 +	+± 4= 上 :	20.7	10.00							
			末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	ガザイバ投与60分前までに投与	終了											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A											
	1 2 3 3 5 5 5 6 6												
			—t— tate .										
			末梢A	ンショット静		10:30							
	ガザイバ投与の30分以上前												
Rp.3	アセリオバッグ 1000mg/100ml	600mg											
T\p.0	7 2 73 7 17 1000mg/ 100mm	ooonig											
			末梢A	持続点滴	15 分	10:30							
	ガギノが振りの20人以上並												
- A	ガザイバ投与の30分以上前			-				-					
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本											
			末梢A	持続点滴	45 分	10:45							
			717112	3 3 430311111-3									
	ガザイバ投与前に45分かけて点	点滴静注											
Rp.5	ガザイバ												
	生理食塩液 250mL	210mL											
	0.22 μ mのインラインフィル		末梢A	持続点滴	25 mL/h	11:30							
	ター付きルートを用いること。		N/III/	1.1 100 700 101	20 1112/11	11.00							
	25mL/hで開始し、最大												
	100mL/hまで上げられる												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本											
			末梢A	持続点滴	30 分	10							
			不怕人	1寸形 从 li	30 77	I IIII							
	ガザイバ投与後の経過観察の	とめ30分で投与											
				-									

VIX 7	スケジュール・ター 薬剤名	田里/出た	北上红坡	手技	投与速度 (単位)	D 1	David	D	Davis	D	Davis	Davis	D	
D 7	架 用石	用重/甲亚	仅分程始	十仅		Day I	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day	
Rp.7														
Rp.8														
тъ.о														
-														
_														
Rp.9														
			1											
Rp.10														
							1							
-														
<u> </u>												1		
Rp.11														
-														
D- 10		+				+	+	+						
Rp.12														
		1												
						1	1	1				1		