

レジメン名: Osimertinib/PEM/CBDCA 肺がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	タグリツソ(オシメルチニブ)
用法・用量	80mg/日 1日1回
投与スケジュール	連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ペムトレキセド	500	500	mg/m ²
3	カルボプラチン	AUC 5	750	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	デキサート 1.65mg	2A	末梢A	持続点滴	30分	9:30							
	グラニセロンバッグ 3mg/50m	1本											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	ペムトレキセド	1本	末梢A	持続点滴	10分	10:00							
	生理食塩液 100mL												
Rp.3	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	1時間	10:10							
	生理食塩液 250mL												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:10							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													