レジメン名:	Pembro/TC 子宮体がん(175/AUC=5)
レングノ 包:	Pellibro/ TO 丁音体が70(T/3/AUC-3)

【1コースの期間】 21日

【内服の抗がん剤】

K1 3/300 0 3/0/0 1 0 /13/2	571JZ						
商品名(一般名)							
用法•用量							
投与スケジュール							

【注射の抗がん剤】

<u></u>	2 3 7 6 7 6 7 1 3 2			
Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	パクリタキセル	175	175	mg∕ <b>m</b> i̇̃
4	カルボプラチン	AUC=5	750mg	/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	デキサート 6.6mg	2V											
	デキサート 1.65mg	2A											
	ガスター 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	ポララミン 5mg	1A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
Rp.2	キイトルーダ		末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
	上 投与時、インラインフィルター(0.2- 5μm)を使用すること。												
Rp.3	パクリタキセル			持続点滴	3 時間	11:00							
l '	生理食塩液 500mL	1本											
			末梢A										
	必ず0.22ミクロン以下のインライン フィルターを使用すること												
Rp.4	カルボプラチン					14:00							
	生理食塩液 250mL	1本		持続点滴	1 時間								
			末梢A										
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本											
			late .	14.44.15.44									
			末梢A	持続点滴	1 時間	15:00							
	 投与後のフラッシュ用												
Rp.6													
'													
L	1			L		L	L	1	L	L	L		