

インターバル日数	21日
----------	-----

商品名(一般名)	プレドニゾロン
用法・用量	1日 100mg
投与スケジュール	Day1-5 連日内服

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
4	ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)	1.8	1.8	mg/Kg
6	ドキシソルビシン	50	50	mg/m ²
8	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ボララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		9:30							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:00							
	リツキシマブBS												
	初回投与時、最初の30分は50mL/hの速度で開始、問題なければ30分毎に50mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												
Rp.4	ボライビー		末梢A	持続点滴	90 分	14:30							
	注射用水20mL	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
	・初回は90分で投与。 ・0.2又は0.22 μ mのフィルター使用。 ・総量72mg未満の場合は、あらかじめ生理食塩液50mLを抜いて残50mLにしてから薬液を注入すること。												
Rp.5	グラニセトロンバッグ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30 分	16:00							
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	16:30							
	ドキシソルピシン												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	16:40							
	ドキソルビシン投与後のフラッシュ												
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	16:45							
	エンドキサン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	17:15							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

インターバル日数	21日
----------	-----

商品名(一般名)	プレドニゾロン
用法・用量	1日 100mg
投与スケジュール	Day1-5 連日内服

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
4	ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)	1.8	1.8	mg/Kg
6	ドキシソルビシン	50	50	mg/m ²
8	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

薬剤名		用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ボララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		9:30							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	100 mL/h	10:00							
	リツキシマブBS												
	2回目以降の投与時、最初の30分は100mL/hの速度で開始、30分毎に100mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												
Rp.4	ボライビー		末梢A	持続点滴	30 分	14:00							
	注射用水20mL	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
	・2回目以降は30分まで短縮可。 ・0.2又は0.22 μ mのフィルター使用。 ・総量72mg未満の場合は、あらかじめ生理食塩液50mLを抜いて残50mLにしてから薬液を注入すること。												
Rp.5	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	14:30							
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	15:00							
	ドキシソルピシン												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:10							
	ドキシソルピシン投与後のフラッシュ												
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	15:15							
	エンドキサン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:45							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

【1コースの期間】

【内服の抗がん剤】

【注射の抗がん剤】

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度〔単位〕	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	9:30							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ボララミン 5mg	1A	末梢A	ファンシヨット静注		9:30							
Rp.3	生理食塩液 500mL	1本	末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
	リツキシマブBS												
	2回目以降の投与時、最初の30分で投与量の20%を投与、問題なければ投与量の80%を60分で投与する。												
Rp.4	ボライビー		末梢A	持続点滴	30 分	11:30							
	注射用水20mL	1A											
	生理食塩液 100mL	1本											
	・2回目以降は30分まで短縮可。 ・0.2又は0.22μmのフィルター使用。 ・総量72mg未満の場合は、あらかじめ生理食塩液50mLを抜いて残50mLにしてから薬液を注入すること。												
Rp.5	グラニセトロンバッグ 3mg/50m	1本	末梢A	持続点滴	30 分	12:00							
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10 分	12:30							
	ドキシソルピシン												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:40							
	ドキシソルビシン投与後のフラッシュ												
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	12:45							
	エンドキサン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	13:15							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													