

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	15:50							
	ピノルビン投与後のフラッシュ												
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	15:55							
	エンドキサン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	16:25							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: R-THP-COP(90分)

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	プレドニゾン
用法・用量	1日 100mg(年齢などにより用量変更あり)
投与スケジュール	Day1-5 連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
5	オンコビン(ピンクリスチン)	1.4mg/m ²	2mg/body	
6	ピノルビン	50	50	mg/m ²
8	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	インシュット静注		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	90分	10:30							
	生理食塩液 500mL												
	2回目以降の投与時、最初の30分で投与量の20%を投与、問題なければ投与量の80%を60分で投与する。												
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:00							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	12:30							
	オンコビン												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	12:40							
	ピノルビン												
	調製後6時間以内に使用												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:50							
	ピノルビン投与後のフラッシュ												
Rp.8	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:55							
	エンドキサン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:25							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													